

Dolor fémoro-patelar o rotuliano

El dolor rotuliano y fémoro-patelar es probablemente la **patología más frecuente en la rodilla**. El paciente siente **dolor debajo y alrededor de su rótula** (hueso redondeado delante de la rodilla)

El dolor empeora al subir-bajar escaleras o cuando se sienta por largo rato

Puede ser en una o las dos rodillas.

La causa exacta del dolor fémoro-patelar se desconoce. Probablemente tiene que ver con la forma como su rótula (patela) se mueve en el surco del hueso de su muslo que es el fémur.

¿Qué puedo hacer para que mi rodilla se mejore y me duela menos?

Tómese un **descanso** de las actividades físicas que pongan bastante presión repetitiva sobre sus piernas tales como correr, jugar voleibol o baloncesto. Si desea seguir haciendo ejercicio, ensaye nadar u otra **actividad de bajo impacto**.

Puede entrenar con máquinas **elípticas** de muy bajo impacto (menos presión sobre sus rodillas). A medida que sus rodillas mejoran usted puede volver a practicar sus deportes normales. Pero haga esto lentamente, aumentando la cantidad de tiempo que hace su actividad deportiva más o menos 20% cada semana.

Haga los **ejercicios** que se muestran a continuación.

Cada ejercicio debe tomarle unos pocos minutos. Hacerlos **dos veces al día** es un buen comienzo. Los primeros dos usualmente son los más importantes pues hacen que los músculos frontales en los muslos (**cuádriceps**) se fortalezcan. Esto es importante pues sus músculos cuádriceps controlan el movimiento de la rótula.

Use **zapatos** apropiados para caminar o para correr le pueden ayudar con su dolor de rodilla. Incluso una simple plantilla que dé apoyo al arco del pie que provenga de una zapatería puede serle útil.

Ponga una **bolsa con hielo** sobre sus rodillas durante diez a quince minutos después de hacer actividades. Esto puede ayudar a aliviar el dolor y a acelerar la recuperación. Para mantener las manos libres use un vendaje elástico para mantener la bolsa con hielo o la bolsa helada en su lugar. Tomarse de forma puntual un **Anti-inflamatorio** tal como Ibuprofeno o Dexketoprofeno también puede ayudarle, pero hable con su médico antes de tomar este medicamento.

En ocasiones se pueden tomar protectores del Cartílago y en casos que no haya mejoría realizamos **infiltraciones con Plasma Rico en Plaquetas** (Terapia Biológica) o con Acido Hialurónico.




Ejercicios para ayudarle con el dolor de rodilla

¡Tenga paciencia! Siga haciendo ejercicio para mejorarse.

El dolor patelofemoral puede ser difícil de tratar y sus rodillas no mejorarán de la noche a la mañana. Algunas personas tienen suerte y se mejoran rápidamente. Pero le podría tomar seis semanas o incluso más para que su rodilla se mejore. Usted tendrá menos probabilidad de sufrir de este dolor nuevamente si se mantiene en buena forma; pero no haga cambios súbitos en sus entrenamientos.

Aquí hay algunos ejercicios para ayudarle con el dolor de su rodilla. Después de que usted hace todos los ejercicios como se muestran en los dibujos, vuelva a la posición inicial y haga los ejercicios con la otra pierna de modo tal que ambas rodillas se beneficien del estiramiento.



1. Fortalecimiento del cuádriceps: isometría. Colóquese de la manera que se muestra arriba. Mantenga la pierna estirada durante diez a veinte segundos y luego relájela. Haga el ejercicio entre cinco y diez veces.




2.-Fortalecimiento del cuádriceps: levantamiento de la pierna recta. Colóquese de la manera que se muestra arriba. Levante la pierna varias pulgadas y sosténgala así durante cinco a diez segundos. Luego baje la pierna hasta el suelo lentamente tomando para ello unos pocos segundos. Haga el ejercicio entre cinco y diez veces.



3.- Estiramiento de la banda iliotibial y de la nalga (ilustrado a mano derecha) Colóquese de la manera que se muestra arriba. De vuelta a su tronco hacia la derecha y use su brazo izquierdo para "empujar" su pierna derecha. Usted deberá sentir el estiramiento en su nalga derecha y en la parte externa de su muslo derecho. Mantenga este estiramiento durante 10 a 20 segundos. Haga el ejercicio entre cinco y diez veces.




4.-Estiramiento de la banda iliotibial (mostrado a al lado izquierdo). Colóquese de la manera que se muestra arriba con su pierna derecha cruzada en frente de su pierna izquierda. Sostenga las manos juntas y muévalas hacia el piso. Usted deberá sentir estiramiento en la parte externa de su muslo izquierdo. Mantenga este estiramiento durante 10 a 20 segundos. Haga el ejercicio entre cinco y diez veces.



5.- Estiramiento del tendón del músculo poplíteo. Colóquese en la posición que se muestra en el dibujo que está arriba a mano izquierda. Doble la rodilla izquierda. Agárrese el muslo con las manos para mantener el muslo estable. Enderece la pierna izquierda que está levantada hasta que sienta un estiramiento. Mantenga este estiramiento durante 5 a 10 segundos. Haga el ejercicio entre cinco y diez veces.



6.- Estiramiento del abductor de la cadera. Mientras está sentado apriete una bola de caucho entre sus rodillas. Mantenga la presión durante 5 a 10 segundos. Haga el ejercicio entre cinco y diez veces. (Si no tiene una bola coloque sus manos o sus puños entre sus rodillas y luego apriete).



7.- Estiramiento del abductor de la cadera (mostrado al lado izquierdo; vista frontal y lateral). Colóquese como se muestra arriba; parándose sobre el pie izquierdo y con la rodilla ligeramente doblada. Lentamente levante la pierna derecha más o menos hasta alcanzar 30 grados, sosténgala así por unos pocos segundos y luego baje lentamente el pie y estire ambas piernas. Haga el ejercicio diez veces. No deje que la pelvis se doble (tuerza) y tampoco deje que sus rodillas viren hacia adentro mientras las tiene dobladas



8.- Estiramiento de cadera y nalga (mostrado al lado izquierdo). Colóquese como se muestra arriba; con la pierna izquierda sobre la pierna derecha y coloque sus manos sobre su rodilla izquierda. Hale la rodilla lentamente hacia su cuerpo mientras se sienta con la espalda recta. Sostenga la posición durante 20 segundos y luego descanse durante varios segundos. Haga el ejercicio 6 veces



9.-Estiramiento de la pantorrilla. Colóquese contra una pared como se muestra arriba. Mantenga su talón izquierdo sobre el piso para sentir la parte posterior de la pierna estirada. Sostenga la posición durante diez a veinte segundos. Haga el ejercicio entre seis y diez veces.

Si tuviera alguna duda o quisiera consultarnos estamos en

www.clinicabernaldez.com

tfno.: 954290198 // 691012597

Sevilla